

泌尿器細胞診（別府）カンファレンス


第2回Web研修会


症例 1


神戸大学医学部附属病院
須广 佑介




- 症例：60歳代、男性
- 検査材料：自然尿
- 標本作製法：オートスメア法（パパニコロウ染色）
- 臨床所見：2020/8/18 膀胱癌疑いで自然尿採取









選択肢


- ①反応性尿路上皮細胞
- ②反応性尿細管上皮細胞
- ③尿路上皮癌
- ④尿膜管癌
- ⑤前立腺癌


症例 2


エスアールエル


池本 理恵


- 症例：70歳代、男性
- 採取部位：自然尿
- 標本作製：LBC法 (Thin prep)
- 現病歴：前立腺癌の放射線治療前の検査で膀胱腫瘍を指摘
TUR BT施行 UC(G2 high grade)
その後3か月後の細胞診















選択肢


- ① デコイ細胞
- ② 異型細胞(反応性)
- ③ 異型細胞(悪性疑い)
- ④ 悪性(UC)
- ⑤ 悪性(腺癌)


症例 3


東北大学病院病理部
三浦 弘守


- 症 例：70歳代 男性
- 主 訴：肉眼的血尿
- 臨床診断：左腎盂癌疑い
(エコー，単純 CT ， MRI)
- 材 料：左腎盂カテーテル尿
(左逆行性腎盂造影時に採取)
- 標本作製：オートスメア
(95%エタノール直接固定)














判 定

- 陰性
- 異型細胞
- 悪性疑い
- 悪性

推 定 病 変

1. 良性尿路上皮集塊
2. 低異型度乳頭状尿路上皮癌
3. 高異型度乳頭状尿路上皮癌
4. 扁平上皮への分化を伴う尿路上皮癌
5. 腺への分化を伴う尿路上皮癌